



ZIKA ?

ใครเสี่ยงบ้าง ?

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มี**ยุงลาย** เป็นพาหะนำโรค หากถูกยุงลายกัด และติดเชื้อนี้ ใครบ้างที่เสี่ยงที่สุด มีอาการและผลกระทบอย่างไร

คนทั่วไป



หากติดเชื้อไวรัสซิกา มีอาการไม่รุนแรง อาการทั่วไป มีไข้ ออกผื่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว และตาแดง สามารถแพร่เชื้อผ่านยุงกัด และทางเพศสัมพันธ์

คนท้อง



เมื่อติดเชื้อไวรัสซิกา มีอาการป่วยเหมือนคนทั่วไป และอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ซึ่งเชื่อสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกทางสายสะดือและเชื่อยังสามารถอยู่ได้นานกว่าคนทั่วไป

ทารก




หากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกา เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง และสติปัญญา ในระยะยาว



เตือน ไวรัสซิกา ระบาด

ปี 2566 พบผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 3 เท่า



หญิงตั้งครรภ์
ติดเชื้อไวรัสซิกา


17 ราย

ทารกศีรษะเล็ก



3 ราย

ข้อมูลผู้ป่วยปี 2563 - 2566



กลุ่มเสี่ยง


หญิงตั้งครรภ์หากติดเชื้อไวรัสซิกา
อาจมีความเสี่ยงที่ทารกจะมีศีรษะเล็ก
ตั้งแต่แรกเกิด และในระยะยาวอาจส่งผล
ต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาได้

การป้องกัน

ทายากันยุง



นอนในมุ้ง



ฉีดสเปรย์กำจัดยุงลาย



เปลี่ยนน้ำหรือใช้ทรายกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย